

Odborné doporučení Společnosti Pravidla testování respiračních infekcí, určující indikační kritéria k vyšetření na SARS-CoV-2 a další respirační viry. Součástí pravidel je i stanovení vykazování výkonů.  
 pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP:  
 JEP:

Schváleno Výborem SLM ČLS JEP dne: 26.8.2022

Detekovaná agens	Standardní RT-PCR i varianta POCT (uzavřený systém)		
	pouze SARS-CoV-2	multiplex základní	multiplex extenzivní
SARS-CoV-2	ano	ano	ano
virus chřipky typu A		ano	ano
virus chřipky typu B		ano	ano
respirační syncytiální virus RSV		ano	ano
adenovirus			ano
metapneumovirus			ano
viry parainfluenzy 1-4			ano
koronaviry ostatní			ano
rhinoviry			ano
...			ano
<b>Indikace</b>	Z diagnostického důvodu k potvrzení/vyloučení COVID-19 <sup>1</sup> ; z důvodů preventivních <sup>2</sup> či epidemiologických <sup>3</sup>	Z diagnostického důvodu jen 1) u nemocných se závažnými příznaky respiračního onemocnění, kteří vyžadují hospitalizaci, 2) u nemocných s rizikovými faktory a s příznaky respiračního onemocnění.	Z diagnostického důvodu jen u nemocných se závažnými příznaky respiračního onemocnění, kteří vyžadují hospitalizaci a intenzivní péči; z důvodu surveillance ARI/ILI (zajišťují lékaři primární péče)
<b>Kódy k vykazání výkonu</b>	<b>82301 nebo 82302</b>	<b>82040 a 82036</b>	<b>82040 1x a 82036 max 3x</b>

**Kódy zdravotních výkonů:**

82036	AMPLIFIKACE EXTRAHUMÁNNÍHO GENOMU METODOU MULTIPLEX PCR
82040	IZOLACE RNA A TRANSKRIPCE PRO VYŠETŘENÍ EXTRAHUMÁNNÍHO GENOMU
82301	DETEKCE NUKLEOVÉ KYSELINY SARS-COV-2 POMOCÍ METODY PCR - VÝSLEDEK POZITIVNÍ
82302	DETEKCE NUKLEOVÉ KYSELINY SARS-COV-2 POMOCÍ METODY PCR - VÝSLEDEK NEGATIVNÍ

<sup>1</sup> u osob s příznaky covid-19 (diagnostická indikace ošetřujícím lékařem), a to zejména u zvýšeného rizika závažného průběhu onemocnění (senioři, osoby s přidruženými chorobami a osoby imunokompromitované) a u pacientů se závažným průběhem, vyžadujícím hospitalizaci, kdy výsledek testu umožní včasné podání antivirotik

<sup>2</sup> při příjmu do nemocnic při incidenci více než 200/100 000 obyvatel za 7 dní ve věkové kategorii 65+ let; při incidenci 100 až 200/100 000 obyvatel za 7 dní ve věkové kategorii 65+ let testovat jen pacienty následujících kategorií: (i) přijímaných k hospitalizaci na oddělení, kde se nacházejí imunosuprimovaní (o rizikosti oddělení rozhoduje ošetřující lékař), (ii) před nástupem do zařízení pro dlouhodobě nemocné, (iii) před operačními výkony v případě vyššího rizika pooperačních komplikací, (iv) u pacientů v závažném stavu vyžadujícím hospitalizaci, pokud výsledek testu ovlivní léčebný postup

<sup>3</sup> v epidemiologicky významných situacích z rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví, např. u zaměstnanců či klientů v sociálních službách, ve zdravotnictví, ve školách a při epidemiologickém šetření v ohnisku nákazy.